

EXPERIENCIA DE CUERPOS EXTRAÑOS EN COLON Y RECTO EN LA UNIDAD ENDOSCOPICA DE LA CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA

Curso C* , Aponte DM **, Rocha N , Gil F **, Montoya R **, Reyes G **, Sánchez C**, Romero J** , Preciado J **, Huertas M**, González C **, Gamba J **, Acero F **, Carvajal G **, Sabbagh L **.**

*** Residente de Gastroenterología y Endoscopia, Fundación Universitaria Sanitas, Bogotá**
**** Docente de Gastroenterología, Fundación Universitaria Sanitas, Bogotá**

INTRODUCCIÓN:

Los cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal alto, son una causa frecuente de consulta en el servicio de urgencias de gastroenterología, sin embargo su presencia en colon y recto es poco frecuente; su incidencia real es desconocida.

Se presenta la experiencia en la Clínica Colombia en los últimos 10 años.

MÉTODOS:

Descripción de una serie de casos de los pacientes que ingresaron a la unidad endoscópica en la clínica Colombia durante el periodo de 2007 a 2017 por sospecha de cuerpo extraño en tracto digestivo bajo y a quienes se les realizó colonoscopia.

RESULTADOS:

Consultaron al servicio de urgencias 2279 casos de cuerpo extraño en tracto gastrointestinal, de los cuales 17 correspondieron a cuerpo extraño en tracto gastrointestinal bajo (0,74%). De estos últimos la edad promedio fue 47.5, la frecuencia en sexo masculino fue de 11 casos (64.7%) y en sexo femenino 6 casos (35.2%)

El 100% de los casos fueron insertados por el paciente en el recto buscando estimulación erótica. El cuerpo extraño más frecuente fue el estuche de cepillo de dientes en 8 pacientes (47%). Seguido de hueso de pollo en 2 pacientes (11,7 %). Los demás elementos como: desodorante, objeto metálico, preservativo, zanahoria, salchichón, cepillo de cabello y botella se encontraron solo una sola vez.

En el 99% de los casos se logró la extracción endoscópica, solo un paciente requirió manejo quirúrgico con extracción de una botella por laparotomía.

CONCLUSIONES:

La presencia de cuerpo extraño en colon y recto es poco frecuente, se presenta más en hombres, secundario a estimulación erótica y en la mayoría de los casos el manejo endoscópico es exitoso.