

Título: esófago de Barrett factores de riesgo

Autores: Julián Martínez, Martín Garzón, Juan Marulanda, Juan Molano, Mario H. Rey

Institución : Endocentro SAS

Ciudad : Bogotá DC

Introducción: el esófago de Barrett (EB) es una patología secundaria a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y es una condición preneoplásica reconocida.

Objetivos: determinar los factores de riesgo para EB en personas sometidas a esofagogastroduodenoscopia (EGD) .

Materiales métodos: estudio de casos y controles con un grupo de pacientes sometidos a EGD en 2015

Resultados: 1011 pacientes, 552 con síntomas de reflujo gastroesofágico, 54% mujeres y 46% hombres, edad promedio de 47 años, rango de edad de 13 a 89 años. Menores de 24 años 59, entre 25 y 49 años 463 entre 50 y 74 años 444, mayores de 75 años 45. Hallazgos endoscópicos: esofagitis péptica 60%, EB 5%, hernia hiatal 75%, anillo de Schatzky 3%, esófago normal 32%.

La tabla 1 resume los OR hallados para EB .

Conclusiones: la edad mayor de 50 años es factor de riesgo para presentar esófago de Barrett.

Tablas y figuras:

Tabla 1. Factores de riesgo (OR) para esófago de Barrett

Factor de riesgo	OR	95%IC	p
Edad mayor a 50 años	5,9	2,86-12,22	P<0,0001
Edad mayor a 75 años	3,5	1,49-8,29	P=0,0040
Género masculino	1,4	0,82-2,45	P=0,2033
Tener hernia hiatal	0,5	0,29-0,92	P=0,0249
Tener síntoma RGE	0,3	0,19-0,59	P=0,0002